

საფოთა გარემო

ჩვენი არჩევანი!

საქართველოს წუნების შკოლებრივთა კავშირი „ორქისი“, პერიოდული გამოცემა № 4, 2014 წელი

კომარსტირება - ნარჩენების ედგრაზი მართვის ხელშეყობისთვის

გვ. 3

ასავლებთ საეართო ველოზი გადაგეხელი სტილის ნაგავსაყრელის გავლენის
შეზღუდვების მიზანისა და მიზანის მიზანის გადამარტინებაზე

გვ. 12





კომპოსტირება - ნიადაგის მდგრადირების საცხალვო ბიოსინგრანული მეთოდი

უკანასკნელი 30-40 წლის მანძილზე მინერალურმა სასუქებმა, ჰესტიციდებმა და ნიადაგის ინტენსიურმა დამუშავებამ განაპირობა ნიადაგის ფიზიკური და ბიოლოგიური დეგრადაცია.

ნიადაგზე ინტენსიური ქიმიური და მექანიზაციული ზემოქმედების შედეგად დარღვეულია მისი სტრუქტურა, დაქვეითებულია ჰუმუსისა და საკვებ ნივთიერებათა შემცველობა, წარმოქმნილია სახნავი ზოლის ქვედა გამკვრივებული ფენა, გაუარესებულია ნიადაგის ფიზიკური თვისებები - წყალგამტარობა, ტენიანობა, აერაცია და სხვ. დადგენილია, რომ ასეთი სახის დეგრადირებულ - „გადაღლილ“ ნიადაგებზე მოსავლიანობა შემცირებულია საშუალოდ 30-35%-ით.



კომპოსტირების ნიადაგი

ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნებისა და ამაღლების უამრავი ბუნებრივი საშუალება არსებობს. მათ შორისაა კომპოსტი, რომელიც ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების საუკეთესო საშუალებაა.



კომპოსტი

კომპოსტირება არის - ბიოლოგიური პროცესი, რომლის დროსაც მიკროორგანიზმების მონაწილეობით ხდება ორგანული ნარჩენების დაშლა და გარდაქმნა ორგანულ მასად - კომპოსტად. კომპოსტი შავი, ფხვიერი მიწის მსგავსი მასაა, რომელიც ხელს უწყობს ნიადაგში ორგანული ნივთიერებების შემცველობის ზრდას, ამარაგებს მას საკვები ნივთიერებებით და აუმჯობესებს მის ფიზიკურ თვისებებს.

კომპოსტირების პროცესი მიმდინარეობს ორგანული ნარჩენების, მიკროორგანიზმების, ტენისა და უანგბადის ურთიერთზემოქმედებით. გარდა ამისა, ჭიაყელების აქტიური ცხოველმყოფელობის შედეგად მიიღება ბიოპუშუსი.



გამოკვლევებით დადგენილია, რომ ბიოპუშუსი:

- leaf ამაღლებს მოსავლიანობას **25-50%-ით**;
- leaf ამცირებს მცენარის ვეგეტაციის პერიოდს **1-2 კვირით**;
- leaf შეიცავს მცენარისათვის საჭირო ელემენტებს ადვილად ასათვისებელ ფორმაში;
- leaf ამცირებს შრომით დანახარჯებს, რადგან არ შეიცავს სარეველებს;
- leaf ამცირებს სათესლე მასალის ხარჯს, რადგანაც ბიოპუშუსის გამოყენებით უმჯობესდება თესლის აღმოცენება;
- leaf ზრდის მცენარის მდგრადობას დაავადებების, გვალვისა და ზედმეტი ტენიანობისადმი;
- leaf ამაღლებს ნიადაგის ბიოცენოზს.



კომპოსტის ეაზიალი

კომპოსტირებისათვის გამოიყენება ის ორგანული ნარჩენები, რომლებიც უხვადაა ჩვენს მეურნეობებში, კერძოდ ხილისა და ბოსტნეულის ნარჩენები, ვაზის ანასხლავი, ნამჯა, თივა, ჩამოცვენილი ფოთლები და სხვ. სრულფასოვანი კომპოსტისთვის აუცილებელია ისეთი ძირითადი კომპონენტები, როგორიცაა შინაური ცხოველების ან ფრინველების ნაკელი, ტორფი, სამზარეულოს ორგანული ნარჩენები, ნაცარი, კვერცხის ნაჭუჭი და სხვ. კომპოსტი შესაძლებელია დამზადდეს ინდივიდუალურად საკუთარ ეზოებში და ბალებში.

კომპოსტის დასამზადებლად საჭიროა ხის ან პლასტმასის ჰაერგამტარი კონტეინერი, რომელსაც კომპოსტერი ეწოდება.



კომპოსტერის კედლები აუცილებლად უნდა ატარებდეს ჰაერსა და წყალს.

კომპოსტერს არ უნდა ქონდეს ძირი, რადგან ამ პროცესისთვის აუცილებელია კონტაქტი ნიადაგსა და საკომპოსტე ნაყარს შორის.



საკომპოსტო ენაცხაბი

საჭირო მასალებია:

- 1 დაქუცმაცებული ორგანული მასა („მწვანე“ და „მუქი“ კომპონენტები)
- 2 შავი მიწა
- 3 ნაცარი
- 4 ნახერხი
- 5 ნყალი
- 6 ფინალი
- 7 ბრეზენტი
- 8 სასათბურე თერმომეტრი



საკომპოსტი ნაყარის ფანჯაპი

კომპოსტის მისაღებად საკომპოსტე ნაყარის მასა უნდა იყოს დაქუცმაცებული და მრავალფეროვანი. პირველ ფენად უნდა განთავსდეს „მუქი“ (ჩამოცვენილი ფოთლები, ხის ბურბუშელა/ნახერხი, ქალალდი, მუყაო), შემდეგ „მწვანე“ (მწვანე ფოთლები, მოთიბული ბალახი, ბალის ანასხლავი) კომპონენტები (10-15 სმ). ამ ფენებს შორის შესაძლებელია განთავსდეს სამზარეულოს (ხილი, ბოსტნეული) ნარჩენები. ასეთი წყება უნდა განმეორდეს რამდენიმეჯერ. საჭმლის ნარჩენების დამატების შემთხვევაში აუცილებელია მიწის, ნახერხის ან ფოთლების დამატება არასასიამოვნო სუნის შთანთქმისთვის. კარგი იქნება თუ ბოლო ფენად გამოვიყენებთ თივას ან ნამჯას და შევფუთავთ ბრეზენტით სასურველი ტემპერატურის შენარჩუნებისთვის.



თივა/ნამჯა

ფოთლები

ნახერხი

მიწა

სამზარეულოს
ნარჩენი


მუკი

აწვანი

სამზარეულოს
ნარჩენი

მუქი

სასურველია საკომპოსტე ნაყარის სიმაღლე იყოს 1,5 მ. მშრალ ამინდში კომპოსტი უნდა მოირწყას კვირაში 2-ჯერ. აუცილებელია თვეში 2-ჯერ ფინალის მეშვეობით არევა მასში აერაციის უზრუნველსაყოფად და შესაბამისად კომპოსტირების პროცესი 3-4 ჯერ ჩქარდება. ასევე საჭიროა დაცული იყოს ორგანული ნარჩენის დაშლის ოპტიმალური $33-60^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურა.



ორგანიზაბი - ჩოხლებიც მონაცილობაზე კომპოსტირების პროცესი

ჭიაყელებს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი აკისრია მიწის გაფხვიერებაში. ჭიაყელა თავისი აქტივობის პერიოდში მუდმივად გადაამუშავებს, შლის და გამოყოფს ნარჩენებს, რომლებშიც ბაქტერიების, აზოტის, კალციუმის, მაგნიუმის, ფოსფორისა და კალიუმის შემცველობა მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე ნიადაგში. ისინი ამდიდრებენ კომპოსტს და ხელს უწყობენ მისი ხარისხობრივი მაჩვენებლის ამაღლებას, შესაბამისად ჭიაყელები წარმოქმნიან მაღალი ხარისხის საკომპოსტე მასას. აღსანიშნავია, რომ გონიერი მებაღეები ცდილობენ ჭიაყელების ეს თვისება მაქსიმალურად გამოიყენონ კომპოსტირების პროცესში.



კომპოსტის გაცივება

კომპოსტის გაცივება კომპოსტის მომწიფების საბოლოო ეტაპია. საკომპოსტე ნაყარის არევის შემდეგ, თუ ტემპერატურა აღარ მატულობს, იწყება ე.ნ. კომპოსტის გაცივების სტადია. გაცივების სტადია დასრულებულად ითვლება, როცა საკომპოსტე ნაყარში ტემპერატურა გაუთანაბრდება გარემოს ტემპერატურას.

გახსოვათ!

დაუმწიფებელი კომპოსტი შესაძლებელია ტოქსიკური აღმოჩნდეს ჩითილებისა და ნერგებისათვის, ამიტომ სასურველია მოხდეს კომპოსტის სრული დაშლა.



მიღებელი კომპოსტის გამოყენება

კომპოსტის ნიადაგში შეტანის წლიური დოზაა საშუალოდ 6კგ 1მ²-ზე. ეს რაოდენობა დაახლოებით სავსე ნიჩაბს შეესაბამება. ჰუმუსით ლარიბ ნიადაგში პირველ წელს საჭიროა მეტი კომპოსტის შეტანა (10-12კგ 1მ²-ზე).

ჩითილების გამოსაყვანი ნიადაგის დამზადებისთვის კომპოსტი უნდა გაიცრას დაახლოებით 6მმ ზომის საცერში. გაცრის შემდეგ დარჩენილი მასა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ახალი კომპოსტის დასამზადებლად პირველ ფენად, იგი აჩქარებს კომპოსტირების პროცესს.



რჩევები:

კომპოსტირების პროცესის ოპტიმიზაციის მიზანისთვის გაცილება:

- ✿ საკომპოსტე ნაყარის მოცულობა
- ✿ კომპოსტის მასის კარგი აერაცია
- ✿ ოპტიმალური ტენიანობა
- ✿ მასალის მრავალფეროვანი ნარევი
- ✿ ნახშირბადისა და აზოტის (C/N) ხელსაყრელი თანაფარდობა
- ✿ კომპოსტირების საწყის ფაზაში ორგანული მასის დათბუნება

კომპოსტის მისამართი ერ გამოიყენა:

- ♥ დაავადებული ან მავნებლებით ძლიერ დაზიანებული მცენარეები
- ♥ სოკოვანი დაავადებით დასწეულებული მცენარეები
- ♥ შხამიანი მცენარეები (მაგ. ლენცოფა, აბუსალათინი)
- ♥ მცენარეები, რომელთა დაშლის პროცესი ხანგრძლივად მიმდინარეობს
- ♥ მცენარეები, რომლებსაც ახასიათებს დიდი მუავიანობა (ფიჭვის წიწვები)
- ♥ კატისა და ძაღლის ექსკრემენტები
- ♥ დაავადებული ცხოველის ნაკელი ან სხვა ორგანული ნარჩენები
- ♥ ლითონი, პლასტმასი, შუშა, ხის დიდი ნაჭრები, დიდი რაოდენობით ქაღალდი


კომპოსტირების საუკეთესო მაგალითს გვაძლევს ბუნება – ტყე, სადაც ეს პროცესი ბუნებრივად მიმდინარეობს. ყველანაირი ორგანული ნარჩენი, რომლებიც ტყეში არსებობს ნიადაგის მიკროორგანიზმების ზემოქმედების შედეგად ტყის ნაყოფიერ მიწად გარდაიქმნება.



სასურველია საკომპოსტე ნაყარი განთავსდეს ისეთ ადგილას, სადაც მოხდება მისი გამოყენება. ამისათვის საუკეთესოა ბალი.

განესოვეთ!

კომპოსტერი არ განათავსოთ ჭის, ნაკადულის ან მდინარის მახლობლად, ასევე არა არის რეკომენდირებული მისი განთავსება მრავალწლიან ხეებთან, რადგან შესაძლებელია მათი ფესვების შეღწევა კომპოსტერში, რომელიც გაართულებს ნაყარის არევას და ხელს შეუწყობს მის გამოშრობას.



კომპოსტირების დროს ორგანულ მასაში მატულობს მცენარისთვის ადვილად შესათვისებელი საკვები ელემენტები (აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი). ხდება პათოგენური მიკროფლორისა და კვერცხების განადგურება, მცირდება ცელულოზისა და პეტიონების რაოდენობა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს საკვები ელემენტების მცენარისათვის ადვილად შესათვისებელ ფორმაში გადასვლის პროცესს.

მცენარეებისათვის მაქსიმალურად ბუნებრივი პირობების შექმნისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს კომპოსტის დამზადებას და მის ნიადაგში შეტანას. კომპოსტი ერთი მხრივ აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას მის ქიმიურ და ფიზიკურ თვისებებს და მეორე მხრივ, უზრუნველყოფს მცენარეებს სასარგებლო საკვები ნივთიერებებით.

მაღონა პირველაშვილი
ნარჩენების მართვის სპეციალისტი
პროექტის „დავასუფთაოთ საქართველო“
რეგიონული კოორდინატორი

ესავლათ საჭართვაცომი განლაგების სტიპულატორი ნაგავსაყრდაბის გავლის მაფიაზე მიმდებარებულ მოქმედების შესაბამისი საკუთრივი სამუშაოების მიმდებარების დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე შესაბამისი საკუთრივი სამუშაოები, რისთვისაც ჩატარდა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები:

დასავლეთ საქართველოში შეირჩა შემდეგი საკუთრივი ობიექტები: იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, გურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და აჭარის ყველაზე უფრო თვალშისაცემი სტიქიური ნაგავსაყრელების მიმდებარე ტერიტორიები. საკუთრივ რეგიონებში აღებული იქნა როგორც ნიადაგის, ასევე წყლის საანალიზო ნიმუშები.

საანალიზო ნიმუშებში ჩატარდა ჰიდროქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები და შესაბამისად განისაზღვრა შემდეგი კომპონენტები: ბიოგენური ელემენტების ზოგიერთი ფორმები: NO_2^- , NO_3^- , NH_4^+ , PO_4^{3-} ; ზოგიერთი ძირითადი იონი: HCO_3^- და SO_4^{2-} ; მძიმე ლითონები (Cu , Zn , Pb , Cd), აგრეთვე ტოტალური კოლიფორმები, ფეკალური სტრეფტოკოკები და E-coli (ნაწლავური ბაქტერიების აქტიური ფორმები).

კვლევებში ინგრედიენტების განსაზღვრისას გამოყენებული იქნა თანამედროვე ISO მეთოდები: იონ-სელექტიური ქრომატოგრაფია (ICP-100), პლაზმურ-ემისიური სპექტრომეტრია (ICP-MS), მემბრანული ფილტრაცია და სხვ.

თითოეული ნიმუშის აღების წერტილი ხასიათდება შემდეგი ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლებით: სიმაღლე ზღვის დონიდან, კოორდინატები, სტიქიური ნაგავსაყრელის საორიენტაციო ფართობი, ტემპერატურა და სხვ. გაზიომვები განხორციელდა პორტატული აპარატის GPS-ის მეშვეობით.

მონაცემების სწორად შეფასების თვალსაზრისით, შეირჩა საკუთრივი ობიექტები, რომლებმაც შეასრულეს ფონის როლი და რომლებთანაც მოხდა დანარჩენი საკუთრივი წერტილების შედეგების შედარება. აგრეთვე, ზოგიერთ შემთხვევაში, მიღებული შედეგები შედარებული იქნა განსასაზღვრელი კომპონენტების ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებთან (ზღვა), ან საორიენტაციო დასაშვებ კონცენტრაციებთან (სდენა).



მიღებული შედეგების უმეტესი ნაწილი წარმოდგენილია ცხრილებისა და გრაფიკების სახით (ცხრ.1-12, გრაფ.1-13).

იმერეთის რეგიონში ჰიდროქიმიური, ფიზიკურ-ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები შესრულდა იმ ნიმუშებში, რომლებიც აღებული იქნა თერჯოლის, ვანის და ხონის მუნიციპალიტეტებში სტიქიური ნაგავსაყრელების მიმდებარე ტერიტორიებიდან. მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრ.1-2-ში და გრაფ.1-ზე.


ცხრილი 1.

იმერეთის რეგიონის სტიქიური ნაგავსაყრელების ტერიტორიებიდან აღებულ ნიადაგის ნიმუშებში მძიმე ლითონების (**Cu, Zn, Pb, Cd**) შემცველობა

სინჯის აღების ადგილი	სინჯის აღების დრო	კოორდინატები	სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ)	Cu, ppm	Zn, ppm	Pb, ppm	Cd, ppm
თერჯოლა, სოფ. ლვანკითი	7.05.2014	332278 4669344	86	25	110	20	<2,5
ვანი, მდ. ჭიშურას მიმდ. ტერიტორია	6.05.2014	294043 4662123	58	48	132	28	<2,5
ხონი, სოფ. კუხი	5.05.2014	288934 4686341	101	55	145	35	<2,5
ხონი (ფონი)	5.05.2014	287601 4689091	126	70	185	15	<2,5
ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდე)	-	-	-	-	-	32	-
საორიენტაციო დასაშვები კონცენტრაციები (სდე)	-	-	-	132	220	130	2,0

გრაფიკი 1.

ტყვიის შემცველობა იმერეთის ნიადაგების საკვლევ ნიმუშებში



ცხრილი 2.

მდ. ჭიშურას წყლის ჰიდროქიმიური და მიკრობოლოგიური ანალიზის შედეგები

	პარამეტრები	ერთეულები	გაზომვის შედეგები
1	pH		7.95
2	ჰიდროკარბონატი	მგ/ლ	78.08
3	ნიტრატი	მგN/ლ	0.193
4	ნიტრიტი	მგN/ლ	0.351
5	ამონიუმი	მგN/ლ	0.264
6	ფოსფატი	მგ/ლ	0.03
7	სულფატი	მგ/ლ	31.886
8	ტოტალური კოლიფორმები	1 ლ-ში	11200
9	E-coli	1 ლ-ში	4500

მიუხედავათ იმისა, რომ ვანისა და სოფ.კუხის (ხონი) საკვლევი ნიადაგის ნიმუშებში ტყვიის შემცველობამ მეტ-ნაკლებად გადააჭარბა თავის ზდკ-ს მნიშვნელობებს, მაინც მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ იმერეთის რეგიონის სტიქიური ნაგავსაყრელების მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგის საკვლევი ნიმუშები ნაკლებადაა დაბინძურებული მძიმე ლითონებით, აღმოსავლეთ საქართველოს ნებისმიერ ანალოგიურ ნიმუშთან შედარებით (ცხრ.1, გრაფ.1). რაც შეეხება მდ. ჭიშურას, მისი ჰიდროქიმიური და მიკრობიოლოგიური მონაცემები მიანიშნებს იმას, რომ ის არ მიეკუთვნება დაბინძურებული მდინარის კატეგორიას (ცხრ.2).

შემდეგი რეგიონი, სადაც ჩატარდა საველე სამუშაოები, არის რაჭა-ლეჩებუმი და ქვემო სვანეთი, კერძოდ, შეირჩა ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში განლაგებული სტიქიური ნაგავსაყრელების მიმდებარე ტერიტორიები, აგრეთვე თითოეული საკვლევი წერტილისათვის - ფონური წერტილები. ცალ-ცალკე აღებულ ნიმუშებში შესრულდა ჰიდროქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები, რომელთა შედეგების გარკვეული ნაწილი წარმოდგენილია ცხრ.3-6-ში და გრაფ.2-7-ზე.

გრაფიკ 2.

რაჭა-ლეჩებუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონიდან აღებულ
ნიადაგის საკვლევ ნიმუშში ფოსფატი იონის შემცველობა

მგ/კგ

 PO_4^{3-} 

გრაფიკი 3.

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონიდან აღებულ ნიადაგის
საკვლევ ნიმუშებში ამონიუმისა და ნიტრიტ იონების შემცველობა



ცხრილი 3.

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის სტიქიური
ნაგავსაყრელების ტერიტორიებიდან აღებულ ნიადაგის
ნიმუშების მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები

სინჯის აღების ადგილი	სინჯის აღების დრო	კოორდინატები	სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ)	ტოტალური კოლიფორნიუმის ტიტრი	E-coli-ის ტიტრი
ონი, მდ. ჯოჯორას მიმდ. ტერიტორია	22.07.2014	371054 4714687	790	0,0001	0,0001
ონი (ფონი)	22.07.2014	371667 4714639	798	0,0001	0,0001
უღვერი, სოფ. ჭალისთავი	21.07.2014	314415 4721326	466	0,0001	0,0001
უღვერი (ფონი)	21.07.2014	317864 4725177	528	0,01	0,01





ცხრილი 4.

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლებით ნიადაგების სანიტარული მდგომარეობის შეფასების სქემა

ნიადაგის კატეგორია	ტოტალური კოლიფორმების ტიტრი	E-coli-ს ტიტრი
სუფთა	1,0 და ზევით	1,0 და ზევით
დაბინძურებული	0,9 - 0,01	0,9 - 0,01
ძლიერ დაბინძურებული	0,009 და ქვევით	0,009 და ქვევით

ჰიდროქიმიური ანალიზის შედეგებმა აჩვენა, რომ რეგიონის ამ ორი მუნიციპალიტეტის ნიადაგის ნიმუშები არ არის მნიშვნელოვნად დაბინძურებული ბიოგენური ელემენტების ფორმებით. მაგალითად, ონის საკვლევ ნიმუშში ფოსფატ იონის შემცველობა ფონურისას აღემატება 3.5-ჯერ, ხოლო ცაგერის საკვლევ ნიმუშში კი ამონიუმის იონი ფონურისას აღემატება მხოლოდ 2.25-ჯერ (გრაფ.2-3).

მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები მოცემულია ცხრ.3-ში, ხოლო შეფასება კი გაკეთდა ცხრ.4-ის მიხედვით. როგორც ჩანს ნიადაგის ნიმუშები ამ შემთხვევაში მიეკუთვნებიან ძლიერ დაბინძურებულის კატეგორიას გარდა ერთი ფონური ნერტილისა, რომელიც მდებარეობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

იგივე ნიმუშებში ჩატარდა ანალიზები ზოგიერთი მძიმე ლითონების შემცველობაზე. მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრ.5-ში და გრაფ.4-5-ზე.

ცხრილი 5.

რაჭა-ლეჩებულისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის სტიქიური ნაგავსაყრელების ტერიტორიებიდან აღებულ ნიადაგის ნიმუშებში მძიმე ლითონების (Cu, Zn, Pb, Cd) შემცველობა

სინჯის აღების ადგილი	სინჯის აღების დრო	კოორდინატები	სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ)	Cu, ppm	Zn, ppm	Pb, ppm	Cd, ppm
ონი, მდ. ჯოჯორას მიმდ. ტერიტორია	22.07.2014	371054 4714687	790	63	262	54	<2,5
ონი (ფონი)	22.07.2014	371667 4714639	798	54	193	16	<2,5
ცაგერი, სოფ. ჭალისთავი	21.07.2014	314415 4721326	466	53	108	21	<2,5
ცაგერი (ფონი)	21.07.2014	317864 4725177	528	31	89	24	<2,5
ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდე)	-	-	-	-	-	32	-
საორიენტაციო დასაშვები კონცენტრაციები (სდე)	-	-	-	132	220	130	2,0

გრაფიკი 4.

თუთიის შემცველობა რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონიდან აღებულ ნიადაგის საკვლევ სინჯებში



გრაფიკი 5.

ტყვიის შემცველობა რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონიდან აღებულ ნიადაგის საკვლევ სინჯებში



თვალნათლივ ჩანს, რომ ონის საკვლევ ნიმუშში თუთიისა და ტყვიის შემცველობამ გადააჭარბა არა მარტო ფონურ მაჩვენებლებს, არამედ შესაბამის სდკ-ს და ზდკ-ს, ხოლო ცაგერის ნიადაგის ნიმუშში კი სპილენძისა და თუთიის მნიშვნელობამ თავიანთი ფონურის მნიშვნელობას გადააჭარბა უმნიშვნელოდ.

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიაზე, ასევე ჩატარდა მდ. ჭალისთავის წყლის ჰიდროქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები, ადგილზე კი გაიზომა მისი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები. მიღებული შედეგები მოცემულია ცხრ. 6-ში და გრაფ. 6-7-ზე.

გრაფიკი 6.

მდ. ჭალისთავის წყალში ამონიუმის იონის შემცველობა

მგ/ლ

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0 NH_4^+

ზდკ

გრაფიკი 7.

მდ. ჭალისთავის წყალში ეშერიხია კოლის (E-coli) რაოდენობა

ერთეული/ლ

5600
5400
5200
5000
4800
4600

E-coli

ზდკ



ცხრილი 6.

მდ. ჭალისთავის წყლის ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები 2014 წ.


სინჯის აღების ადგილი	სინჯის აღების დრო	კოორდინატები	pH	conductivity	salinity	DO	T°
ცაგერი, სოფ. ჭალისთავი	21.07.2014	314415 4721326	8.6	99.5	0.1	4.5	17.6

შეიძლება ითქვას, რომ ისე როგორც იმერეთის შემთხვევაში, რაჭა-ლეჩხუმში არსებული (ონი, ცაგერი) სტიქიური ნაგავსაყრელების მიმდებარე ტერიტორიები ნაკლებადაა დაბინძურებული, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოს ანალოგიური საკვლევი ობიექტების უმეტესი ნაწილი, თუმცა მიკრობიოლოგიური თვალსაზრისით, ანალიზის პასუხებმა აჩვენა, რომ როგორც ნიადაგის, ასევე მდ. ჭალისთავის წყლის საკვლევი ნიმუშები დაბინძურებულია ისეთი ნაწლავური ტიპის აქტიური ბაქტერიებით, როგორებიცაა E-coli და ტოტალური კოლიფორმები (გრაფ.7).

გურიის რეგიონში საანალიზო საკვლევი სინჯები აღებული იქნა ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე. ფონური წერტილი შეირჩა იგივე ტერიტორიაზე, ოღონდ სტიქიური ნაგავსაყრელებიდან მოშორებით. წყლის სინჯები აღებული და გაანალიზებული იქნა მდ. ბუჟუიდან (ოზურგეთი) და მდ. შუთისხევიდან (ლანჩხუთი). მიღებული შედეგები მოცემულია ცხრ.7-8-ში და გრაფ.8-10-ზე.

გრაფიკი 8.

გურიის რეგიონიდან აღებულ ნიადაგის საკვლევ ნიმუშებში ბიოგენური ელემენტების შემცველობა



ცხრილი 7.

გურიის რეგიონის სტიქიური ნაგავსაყრელების ტერიტორიებიდან აღებული ნიადაგის ნიმუშების მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები

სინჯის აღების ადგილი	სინჯის აღების დრო	კოორდინატები	სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ)	ტოტალური კოლიფორმების ტიტრი	E-coli-ის ტიტრი
ოზურგეთი, სანაპიროს ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია	06.08.2014	748027 4645341	63	0.001	0.001
ლანჩხუთი, სოფ. გულიანი (მდ. შუთისხევი)	06.08.2014	741682 4656693	56	0.1	0.1
ფონი	06.08.2014	-	-	0.1	0.1


ცხრილი 8.

გურიის რეგიონის სტიქიური ნაგავსაყრელების ტერიტორიებიდან აღებულ ნიადაგის ნიმუშებში მძიმე ლითონების (Cu, Zn, Pb, Cd) შემცველობა

სინჯის აღების ადგილი	სინჯის აღების დრო	კოორდინატები	სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ)	Cu, ppm	Zn, ppm	Pb, ppm	Cd, ppm
ოზურგეთი, სანაპიროს ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია	06.08.2014	748027 4645341	63	91	242.0	58	<2,5
ლანჩხუთი, სოფ. გულიანი (მდ. შუთისხევი)	06.08.2014	741982 4656693	56	64	72.0	18.0	<2,5
ფონი	06.08.2014	-	-	-	-	-	<2,5
ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდკ)	-	-	-	-	-	32	-
საორიენტაციო დასაშვები კონცენტრაციები (სდკ)	-	-	-	132	220	130	2,0

გრაფიკი 9.

ტყვიის შემცველობა გურიის ნიადაგების საკვლევ ნიმუშებში




გურიის რეგიონის ტერიტორიაზე გამოიკვეთა ოზურგეთში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე სტიქიური ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორია. აქ აღებულ ნიადაგის ნიმუშებში ბიოგენური ელემენტებიდან NO_2 -ის კონცენტრაციამ ფონურისას გადააჭარბა დაახლოებით 8-ჯერ, PO_4^{3-} -ის შემცველობამ - 6-ჯერ. მოცემული საკვლევი ტერიტორია ასევე დაბინძურებულია მიკრობიოლოგიურადაც (ცხრ.7). რაც შეეხება მძიმე ლითონებს, თუთის შემცველობამ საკვლევ ნიმუშებში გადააჭარბა არა მარტო ფონური წერტილის კონცენტრაციას, არამედ მის სდკ-ს სიდიდესაც კი. ასევე ზდკ-ზე მაღალი ალმოჩნდა ისეთი ტოქსიკური ლითონის კონცენტრაცია როგორიცაა ტყვია. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და გურიის ნიადაგის ნიმუშებში არცერთხელ არ დაფიქსირდა კადმიუმის შემცველობა (ცხრ.8, გრაფ.9).

მოცემული რეგიონის საკვლევი მდინარეების წყლის ნიმუშებში გამოიკვეთა ტოტალური კოლიფორმებისა და ეშერიხია კოლის (*E-coli*) გარკვეული რაოდენობა, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მათი ამ რაოდენობით არსებობა ბუნებრივ ზედაპირულ წყალში, არ არის რაიმე საგანგაშო ფაქტი (გრაფ.10).

გრაფიკი 10.

ეშერიხია კოლისა (*E-coli*) და ტოტალური კოლიფორმების რაოდენობა მდ. ბუნებისა და მდ. შუთისხევის წყლის ნიმუშებში



აჭარის რეგიონში, საანალიზო ნიმუშების ასაღებად, შეირჩა შემდეგი საკვლევი ობიექტები: ქედის მუნიციპალიტეტი - სოფ. კოკოტაური; ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი - მდ. ჭოროხის მარჯვენა ნაპირი და შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორია. ყველა აღებულ სინჯში შესრულდა ჰიდროქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები, მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრ.9 და გრაფ.11-13.




ცხრილი 9.

აჭარის რეგიონის სტიქიური ნაგავსაყრელების ტერიტორიებიდან აღებული ნიადაგის საკვლევი ნიმუშების მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები

სინჯის აღების ადგილი	სინჯის აღების დრო	კოორდინატები	სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ)	ტოტალური კოლიფორმების ტიტრი	E-coli-ის ტიტრი
ქედა, სოფ. კოპოტაური	19.08.2014	256566 4613863	317	0,0001	0,0001
ხელვაჩაური, მდ. ჭოროხის მარჯვენა ნაპირი	19.08.2014	721707 4605703	25	0,001	0,001
შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერი- ტორია (ფონი)	19.08.2014	265924 4612079	439	>1,0	არ აღმოჩნდა


გრაფიკი 11.

სპილენძის შემცველობა აჭარის რეგიონიდან აღებული ნიადაგის საკვლევ სინჯებში




გრაფიკი 12.

თუთიის შემცველობა აჭარის რეგიონიდან აღებული ნიადაგების საკვლევ ნიმუშებში



გრაფიკი 13.

ტყვიის შემცველობა აჭარის რეგიონიდან აღებულ ნიადაგის საკვლევ სინჯებში



გრაფ.11-13-იდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აჭარის რეგიონში მძიმე ლითონებით დაბინძურების მაღალი ხარისხით გამოირჩევა ხელვაჩაურის სტიქიური ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორიის ნიადაგი (გრაფ.13). მოცემული ტერიტორიიდან აღებულ საანალიზო ნიმუშებში ტყვიის კონცენტრაციამ ზდკ-ს გადააჭარბა 4.3-ჯერ, ხოლო ფონური წერტილის შემცველობას კი - 8-ჯერ. ამავე ნიმუშებში დაფიქსირდა სპილენძისა და თუთიის მაღალი კონცენტრაციებიც. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ქედისა და ხელვაჩაურის საკვლევი სინჯები აღმოჩნდა მიკრობიოლოგიურად საკმაოდ დაბინძურებული (ცხრ.9).

მიღებული შედეგების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთ საქართველოს სტიქიური ნაგავსაყრელების მიმდებარე ტერიტორიები შედარებით მცირედაა დაბინძურებული, შერჩეული კომპონენტების მიხედვით, აღმოსავლეთ საქართველოს ანალოგიურ ტერიტორიებთან შედარებით. თუმცა ზოგიერთი მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგებისა და ასევე მძიმე ლითონების შემცველობების მიხედვით აჭარისა და გურიის რეგიონების ნაგავსაყრელების მიმდებარე ტერიტორიები შეიძლება აღმოჩნდეს საკმაოდ სახიფათო ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.

მოცემული პერიოდის განმავლობაში სულ ჩატარდა 400-მდე მიკრობიოლოგიური და ქიმიური ანალიზი, რომლებიც დამუშავდა და განისაზღვრა საქართველოს 2 წამყვან ლაბორატორიაში: სამეცნიერო კვლევით ფირმა „გამა“-ში და ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტა-მენტის ლაბორატორიაში.

პროექტის ფარგლებში განსაზღვრული დამაბინძურებელი კომპონენტების მიერ გამოწვეული დაავადებების ნუსხა, მათი ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრის შემთხვევაში, წარმოდგენილია ცხრ.10-12-ში.



ცხრილი 10.

ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრილი ზოგიერთი მძიმე ლითონის მიერ (Cu, Zn, Pb, Cd) გამოწვეული დაავადებების ჩამონათვალი

	ელემენტის სახეობა	ორგანიზმში მოხვედრილი კონცენტრაცია	ცვლილებები ადამიანის ორგანიზმში
1	Zn	>150 (მგ/დღეში)	<ul style="list-style-type: none"> - იმუნური სისტემის დაქვეითება - კუჭის კედლების ეროზია - სისხლის ფორმულის შეცვლა (რკინის შემცველობის დაქვეითება) - ლვიძლის ფუნქციის მუშაობის გაუარესება - პროსტატის ფუნქციის დაქვეითება
2	Cu	>1.01 (მგ/ლ სისხლში)	<ul style="list-style-type: none"> - კუჭის კედლების გახვრეტა - თირკმელების ფუნქციის დაქვეითება (სპილენძი ძირითადად კონცენტრირება თირკმელის ქსოვილში)
3	Pb	1000-1200 (მკგ/ლ სისხლში)	<ul style="list-style-type: none"> - ენცეფალოპათიის ნიშნები
		800 „–“	<ul style="list-style-type: none"> - ანემია
		500 „–“	<ul style="list-style-type: none"> - ჰემოგლობინის გამომუშავების დაქვეითება, ნერვული სტრესი
		400 „–“	<ul style="list-style-type: none"> - ალანინის შემცველობის მკვეთრი ზრდა შარდში
		300 „–“	<ul style="list-style-type: none"> - პერიფერიული ნერვული სისტემის დისფუნქცია
		200-300 „–“	<ul style="list-style-type: none"> - პროტოპორფინის მკვეთრი ზრდა მამაკაცების ერითროციტებში
		150-200 „–“	<ul style="list-style-type: none"> - პროტოპორფინის მკვეთრი ზრდა ქალების ერითროციტებში
4	Cd	1-5 მკგ	<ul style="list-style-type: none"> - თირკმელების მუშაობის ფუნქციის მოშლა (ხელს უწყობს ქვების დაგროვებას) - ფილტვის ფუნქციის დაქვეითება - სიმსივნური დაავადებების ჩამოყალიბება

ცხრილი 11.

ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრილი ზოგიერთი აზოტშემცველი ნაერთების მიერ გამოწვეული დაავადებების ჩამონათვალი

ელემენტის სახეობა	ორგანიზმში მოხვედრილი კონცენტრაცია	ცვლილებები ადამიანის ორგანიზმში
1 NO_2^-	$>0.23 \text{ მგ/მ}^3$	<ul style="list-style-type: none"> - აქვეითებს ყნოსვას - ალიზიანებს სასუნთქი ორგანოების ქსოვილებს - ასუსტებს მხედველობას - იწვევს ორგანიზმში ჟანგბადის ნაკლებობას (ჰიპოქსია)
2 NO_3^-	$>312 \text{ მგ/დღე-ლამეში}$	<ul style="list-style-type: none"> - კუჭ-ნაწლავის სისტემის ფუნქციონირების დაქვეითება - ჰიპოქსია - გულ-სისძარღვთა სისტემის შესუსტება (წნევის მკვეთრი დაცემა)
3 $\text{NH}_4^+ (\text{NH}_3)$	$>0.4-0.7 \text{ (მგ/ლ სისხლში)}$	<ul style="list-style-type: none"> - გულის რევა, კომა - ქსოვილების საერთო ჰიპოქსია



ცხრილი 12.

ზოგიერთი ბაქტერიების მიერ ადამიანის ორგანიზმში
მოხვედრისას გამოწვეული დაავადებების ჩამონათვალი

	ორგანიზმში მოხვედრილი ბაქტერიის სახეობა	დაავადების სახეობა
1	E-coli	დიარეა, კოლიტი, პერიტონიტი, პროსტატა, სეფსისი, მენინგიტი, ნაწლავის ფუნქციის დარღვევა, საშარდე გზების ანთება
2	ფეკალური სტრეპტოკოკები	სასუნთქი ორგანოების ფუნქციონი- რების რღვევა, ქუნთრუმა, რევმა- ტიული დაავადებების მკვეთრი გაუა- რესება, ბრონჰიტი, პნევმონია, ლიმ- ფადენიტი, მენინგიტი, პაროდონტი- ტი, ფარინგიტი, ენდოკარდიტი

ამრიგად, ზემოაღნიშნული დამაბინძურებლები, სტიქიური ნაგავსაყრელებიდან, შესაძლე-
ბელია ადვილად ალმოჩნდნენ ეკოსისტემებში და შესაბამისად დააბინძურონ გარემო, მსგავსი
საშიშროება რომ არსებობს, ამის საბაბს იძლევა ის მიღებული მონაცემები, რომლებიც
ნარმოდგენილია მოცემულ ნაშრომში.

ავტორები:

ნუგზარ ბუაჩიძე
ქიმიურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

ხათუნა ჩიკვილაძე
გეოგრაფიულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი





სარედაქციო კოლეგია: მარიამ ქიმერიძე
მადონა პირველაშვილი
ხათუნა ჩიკვილაძე
ნუგზარ ბუაჩიძე
დიზაინი: თამარ გრძელიძე



პროექტი „დავასუფთაოთ საქართველო - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში“ ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მხარდაჭერით